

I barkborreskadat timmer tillåts ej lagringsröta

Vilka träd duger som timmer även efter att de har varit angripna av barkborren?

Det är näst intill omöjligt att veta genom att enbart titta på det stående trädet. Det finns granar som fortfarande har gröna barr i toppen men ändå blivit angripna av lagringsröta. Det finns träd som varken har gröna eller bruna barr kvar på grenarna och ingen bark, men som inte har lagringsröta.

Det beror troligtvis på när de blev angripna under våren, sommaren eller hösten som har gjort att lagringsrötan växt till.

Vi har också erfarenhet av att rotstocken kan vara fri från lagringsrötan men att stockarna därefter har blivit angripna varför man måste vara noggrann vid upparbetningen av hela stammen.

Barkborreskadat timmer köps ej i alla regioner. Kontakta din inköpare före avverkning.

När du skall aptera sågtimmer av dessa träd är det därför i skäret som Du måste titta efter lagringsrötan. Bilderna på denna sida har tydliga **"morotsfärgade"** strimmor av lagringsröta och duger därför inte till sågtimmer.

Massaved 1600

Lagringsröta i enskild stock max 10 procent av tvärsnittet 15 cm innanför stockändan.

Barkborrens biologi

Granbarkborren svärmar i **maj - juni**. (Vid en varm sommar som den 2018 svärmade de redan i slutet av april och en andra svärmning kom i juli) Hanen borrar sig in under barken och avger feromon (dofter) som attraherar honor och andra hanar. Varje hane har normalt två eller tre honor. Honorna gör en ca. 10 cm lång modergång utmed fiberriktningen. Larverna äter slingrande gångar vinkelrätt ut från modergången.



* I slutet av **juli - augusti** (sommaren 2018 var det från slutet på juni till september) kläcks den nya generationen, som efter en tids näringsgnag under barken, till stor del lämnar angripna träd under hösten för att övervintra i förnan.

Övervintrar i stammarna

* På senare år har man sett att granbarkborren till stor del (> över 50 %) övervintrar under barken på stående träd, (Gäller södra Sverige). Därför är det av största vikt att **hitta** och **plocka ut** dessa träd före maj-juni innan de flyger ut och angriper nya träd. Träd som är nedsatta i närheten av angripna träd måste därför plockas ut i samband med att de synligt angripna träden avverkas.

Naturliga fiender skall vi vara rädda om!

Tack vare löpande tillskapande av högstubbar och kulturstubbar har skogsbruket även gynnat barkborrens naturliga fiender. Vi hoppas och tror därför att det snabbare skall bli en balans mellan barkborrarna och dess fiender vilket kan hjälpa oss att snabbare bromsa upp angreppet över tid.

Tänk på att träd där barken helt har fallit av bör lämnas kvar i skogen, då de hyser barkborrens fiender.

Vida Skog, december 2018

